

Como dar naloxone nasal

Naloxone de Nasal

1 Abra el paquete de Narcan.



2 Incline la cabeza hacia atras. Inserte la punta del aerosol nasal en cualquiera ventana de la nariz.



3 Presione el émbolo firmemente para liberar la dosis de naloxona nasal. Retire el émbolo después de administrar la dosis.



4 Si no hay reacción en 3 minutos, administre la segunda dosis.

Como dar naloxone inyectable

Naloxone de Inyectable


1 Retire la tapa del vial de naloxona y destape la aguja.



2 Inserte la aguja a través del tapón de goma con el vial al revés. Tire del émbolo hacia atrás y tome hasta 1 ml.



3 Inyecte 1 ml de naloxona en la parte superior del brazo, el muslo o la nalga.



4 Si no hay reacción en 3 minutos, administre la segunda dosis.

PREVENCIÓN DE LA SOBREDOSIS DE OPIOIDES



HEPPAC

HIV Education and Prevention Project of Alameda County

5323 Foothill Blvd
Oakland, CA 9601

Overdose Prevention Education and Naloxone Distribution (OPEND) Project

Si tienes unas preguntas o necesitas Narcan

Llama 510.434.0307

Escribe info@casasegura.org

Prevención de la Sobredosis

Riesgos & Hechos

USAR CON AMIGOS:

Nunca uses solo. SIEMPRE lleve Narcan y NUNCA lo use solo, estar preparado reduce su riesgo.

NIVEL DE TOLERANCIA:

Si no usas o no puedes usar en un tiempo grande, hay un cambio en el nivel de tolerancia.

EMPIEZA POCO A POCO:

Heroína que tiene Fentanyl es mas fuerte y rapido. Para estar seguro, haga una prueba de disparo.

NO MEZCLAR LAS DROGAS:

Si puedes, usas una droga. Intente usar una droga a la vez o menos de cada droga, mezclarlos aumenta significativamente su riesgo de sobredosis.

COMPROBAR POR FENTANYL:

Compre a alguien de su confianza, SIEMPRE pruebe sus drogas. CUALQUIER píldora o polvo se puede mezclar con fentanilo.


SER FLEXIBLE CON EL CONSUMO:

La inhalación conlleva menos riesgo de sobredosis que la inyección. Si está inyectando, asegúrese de ir LENTO.

MANTENERSE SANO:

Descansa, bebe agua y come bien.

SIGNOS DE UNA SOBREDOSIS DE OPIOIDES



LLAMA INMEDIATAMENTE AL 911!

DESPUES:



Dar naloxone



1 respiración cada 5 segundos

5 PASOS PARA SALVAR UNA VIDA



PRIMERO

SACUDIR sus hombros, **RASTRILLAR** su pecho y **GRITAR** su nombre



SEGUNDO

DAR NALOXONE



TERCERO

LLAMA 911, dice la persona **NO ESTA RESPIRANDO**



CUARTO

EJECUTAR respiraciones de rescate

× 2

QUINTO

SEGUNDA DOSIS después de 2-3 minutos si no hay respuesta

Narcan desaparecerá en 30-90 minutos. NO permita que alguien lo use nuevamente. Busque atención médica INMEDIATAMENTE después de una sobredosis.