



About injectable PrEP: lenacapavir (Yeztugo®)



PrEP is safe and can reduce your risk of HIV by more than 99%.



Day 1: Get 2 shots and 2 pills
Day 2: Take 2 pills
Every 6 months: Get 2 shots



Protection from HIV starts 2 hours after you take the 2 pills on day 2.



You will get HIV and STI testing at your clinic visits.



Tell your provider if you plan to stop or restart PrEP.

How to get injectable lenacapavir PrEP

Getting the injection (shot)

- You can only get the shot in a medical clinic.
- The 2 shots are given in either the belly or thighs.
- The shot goes into the fatty layer under your skin. People with little body fat may need to be examined to make sure the fatty layer is thick enough to absorb the full shot.
- Your provider's office will work with your insurance and a specialty pharmacy to have each injection delivered to their office.

Cost and insurance

- Health insurance covers injectable PrEP in many situations.
- Work with your provider to see if they can provide you injectable PrEP based on your insurance.
- If you do not have insurance you may be able to get injectable PrEP for free if you qualify for an assistance program.

Getting the shot

Get the shot every 6 months

- Day 1: Get 2 injections (shots) and 2 pills
- Day 2: Take 2 pills
- Every 6 months after that: Get 2 shots

Come back on time

- **Coming to the clinic on time for each shot is key to staying protected against HIV.**
- The clinic will help you schedule a visit for each shot.
- Set a reminder in your phone for your next shot.

Missing a shot?

- Ideally, each shot is 26 weeks after the last one. But it can be any time between 24 to 28 weeks after, if needed.
- **Speak to your provider if you will be away when a shot is due.** They may prescribe you a pill form of PrEP to protect you. Lenacapavir can be taken as a pill once a week for up to 6 months. You can stop taking the pill once you get another shot.

Lab testing

- Before starting injectable PrEP you will get tests for HIV, STIs, and hepatitis C. Every injection visit will include HIV and STI testing. You can also choose to get screened for STIs every 3 months between injections.

Side effects

- The most common side effects are a lump (nodule), pain, and hardening of the skin where you got the shots.
- The lump is a pocket of medication (also called a "depot") in the fatty layer under the skin that slowly releases medication over 6 months. While most people develop a lump, the medication works even if you do not get one.
- The lump usually lasts about 1 year. **Do not massage the lump.**
- Other side effects include swelling, itchiness or redness at the injection site, headache, nausea, dizziness, vomiting, or diarrhea.

If you need to stop or restart

Stopping lenacapavir

- If you want to stop lenacapavir, talk to a healthcare provider about other HIV prevention methods. You can switch to a different PrEP shot (cabotegravir) or take PrEP as a pill, or use condoms.
- Injectable PrEP stays in your system up to 1 year or longer but at a low level that does **not** protect against HIV.
- If you have sex without a condom more than 28 weeks after your last injection, call your provider. If it has been less than 72 hours since sex, you may benefit from PEP, an emergency medication that prevents HIV.

Restarting lenacapavir

- If more than 28 weeks have passed since your last shots, you may need to restart by taking your next shots with pill doses taken on days 1 and 2.



Acerca de la PrEP inyectable: lenacapavir (Yeztugo®)



La PrEP es segura y puede reducir el riesgo de contraer VIH en más del 99%.



Día 1: 2 inyecciones y 2 pastillas
Día 2: 2 pastillas
Cada 6 meses: 2 inyecciones



La protección contra VIH comienza 2 horas después de tomar las 2 pastillas el día 2.



Le harán pruebas de VIH e ITS en sus visitas a la clínica.



Informe a su proveedor si piensa suspender o reiniciar la PrEP.

Cómo obtener lenacapavir, la PrEP inyectable

Recibir la inyección

- Sólo puede recibir la inyección en una clínica médica.
- Las 2 inyecciones se realizan en la panza o en los muslos.
- La inyección se administra en la capa de grasa debajo de la piel. Las personas con poca grasa corporal podrían necesitar un examen para asegurarse de que la capa de grasa sea lo suficientemente gruesa como para absorber la inyección por completo.
- El consultorio trabajará con su seguro y una farmacia especializada para que le entreguen cada inyección su oficina.

Los costos y el seguro

- El seguro médico cubre la PrEP inyectable en muchas situaciones.
- Trabaje con su proveedor para ver si puede proporcionarle la PrEP inyectable según su seguro.
- Si no tiene seguro, es posible que pueda recibir la PrEP inyectable gratuita si califica para un programa de asistencia.

Las inyecciones y su rutina

Reciba la inyección cada 6 meses

- Día 1: Reciba 2 inyecciones y tome 2 pastillas
- Día 2: Tome 2 pastillas
- Cada 6 meses: Reciba 2 inyecciones

Volver a tiempo

- **Volver a la clínica a tiempo para cada inyección es clave para mantenerse protegido contra el VIH.**
- La clínica le ayuda a programar una visita para cada inyección.
- Ponga un recordatorio en su móvil para su próxima inyección.

¿Perdió una inyección?

- Lo ideal es que cada inyección se realice 26 semanas después de la última. Pero puede ser en cualquier momento entre 24 y 28 semanas después, si es necesario.
- **Hable con su médico si estará fuera cuando le toque la inyección.** Es posible que le receten una pastilla de PrEP para protegerse mientras esté fuera. Lenacapavir se puede tomar en forma de pastilla 1 vez a la semana durante un máximo de 6 meses. Puede dejar la pastilla una vez que reciba la siguiente inyección.

La analítica

- Antes de iniciar la PrEP inyectable, le hacen exámenes de VIH, ITS y hepatitis C. Cada visita de inyección incluye pruebas de VIH e ITS. También puede optar por hacerse exámenes de ITS cada 3 meses entre las inyecciones.

Los efectos secundarios

- Los efectos secundarios más comunes son un bulto (nódulo), dolor, o endurecimiento de la piel en el lugar donde recibió las inyecciones.
- El bulto es una acumulación de medicamento (también llamada "depósito") en la capa de grasa debajo de la piel que libera el medicamento lentamente durante 6 meses. Si bien a la mayoría de las personas les aparece un bulto, el medicamento es eficaz incluso si no se forma ninguno.
- El bulto suele durar aprox. un año. **No masajee el bulto.**
- Otros efectos secundarios son hinchazón, picazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos o diarrea.

Si necesita suspender o reiniciar

Suspender lenacapavir

- Si desea suspender lenacapavir, hable con un médico sobre otras formas de prevención del VIH. Puede cambiar a otro medicamento de PrEP inyectable (cabotegravir) o a PrEP en forma de pastilla, o puede usar condones.
- La PrEP inyectable permanece en su organismo hasta por un año, pero en un nivel bajo que **no** protege contra el VIH.
- Si tiene relaciones sexuales sin condón más de 28 semanas después de su última inyección, comuníquese con su médico. Si tuvo relaciones hace menos de 72 horas, podría beneficiarse de PEP, un medicamento de emergencia que previene el VIH.

Reiniciar lenacapavir

- Si han pasado más de 28 semanas después de su última inyección, posiblemente necesite reiniciar el tratamiento recibiendo la siguiente inyección y a la vez tomando dosis de pastillas el día 1 y el día 2.